



Ptáci našich zahrad

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 840 111 111, 601 267 267, www.scvk.cz, info@scvk.cz



Soutěž

STAVÍME PTAČÍ BUDKY

Skupina vodárenských společností Severočeská vodárenská společnost a. s. a společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. připravila pro školní družiny soutěž.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

- Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech typů základních škol, kteří chodí do školní družiny.
- Registraci je možné provést e-mailem, poštou nebo telefonicky do 5. března 2019.
- Stavebnici ptačí budky Vám doručíme na základě Vaší registrace, nejdéle do 12. března 2019.
- Pomoc staršího spolužáka nebo dospělé osoby při sestavování budky je povolena.
- Budku si mohou děti libovolně vyzdobit, fantazii se meze nekladou.
- Obrázek děti mohou malovat libovolnou technikou – kresba, malba, koláž, kombinovaná technika atd., znázorňující nebo jinak vyjadřující jakoukoli souvislost s obyvateli ptačí budky.
- Do soutěže vyberte pouze jeden obrázek za oddělení školní družiny (ať si děti samy vyberou, který je bude v soutěži prezentovat), vyfoťte a zašlete. Neposílejte nám obrázky poštou.
- Fotografie je možné pořídit i mobilním telefonem. Zasláné fotografie se nevracejí.
- Do soutěže zašlete vždy jednu fotografii ptačí budky a jednu fotografii vybraného obrázku za oddělení školní družiny. Fotografie zašlete společně s vyplněnou přihláškou v elektronické podobě!





Vrabcec domácí

Passer domesticus

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: vrbcovití

Je malý zástupce čeledi vrbcovitých a nejrozšířenější žijící pták. Vyskytuje se na území Asie, Evropy, Ameriky i Austrálie. Pochází pravděpodobně z Malé Asie nebo Arabského poloostrova a do Evropy se dostal již před tisíci lety. Podobně jako kos černý se i vrabcec domácí skvěle přizpůsobil životu ve městech a donedávna šlo o typického obyvatele oblastí obývaných člověkem, který mu poskytoval úkryt a potravu. Ovšem v poslední době na řadě míst z nejasných příčin vymizel.



Rehek zahradní

Phoenicurus phoenicurus

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: lejskovití

Je malý stěhovaný pták z řádu pěvců. Do střední Evropy přilétá v první polovině dubna, na zimoviště v Subsaharské Africe odlétá v září až v první polovině října. Vyskytuje se ve světlých listnatých a smíšených lesích, zahradách a parcích, většinou v nížinách. Za potravu mu slouží hmyz, který loví za letu nebo ho sbírá z listů. Nevyhýbá se ani žahavému hmyzu. Před konzumací jej klepáním o tvrdý povrch zbaví křídél, nohou a žihadel. Živí se také pavouky a na podzim bobulemi.





Sýkora koňadra

Parus major



Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: sýkorovití

Je malý druh pěvce z čeledi sýkorovitých. Je největším a nejrozšířenějším evropským druhem sýkor. Sýkora koňadra je velká asi jako vrabec domácí. Dorůstá délky 13,5–15 cm a váží 14–23 g. Hlavu má leskle černou, jen tváře a příuší jsou bílé. Na jaře a v létě se živí převážně živočišnou stravou. Hlavní složku potravy tvoří hmyz v různých vývojových stádiích. Hlas má proměnlivý, volání je rytmické. Ptáci dodržují rytmus, ale sled, výšku a počet tónů obměňují, a tak vytvářejí řadu variant; každá koňadra umí až 10 variant.



Sýkora modřinka

Cyanistes caeruleus



Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: sýkorovití

Je menší než sýkora koňadra, s malou kulatou hlavou vmáčkou mezi ramena (působí dojem, jako by neměla krk). Nejvýraznějšími znaky, kterými se liší od všech ostatních středoevropských druhů sýkor, jsou modré temeno a černý proužek přes oko. Hnízdí ve většině Evropy s výjimkou nejsevernějších oblastí, dále v severní Africe, Malé Asii a na Blízkém východě. Sýkora modřinka patří mezi cenné požírače rostlinných škůdců, jako jsou například motýlí housenky, křísici nebo mšice, ačkoli na jaře oštipuje i mladé pupeny a listy stromů a vyhledává různá semena.





Sýkora uhelníček

Periparus ater



Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: sýkorovití

Malý druh sýkory s velkou černou hlavou, bílými lícemi a velkou bílou skvrnou v týlu, díky které ji lze odlišit od všech ostatních evropských sýkor. V České republice hnízdí téměř na celém území od nížin až po horní hranici lesa. V potravě dospělých ptáků převažují stejnokřídlí a dále jsou zastoupeni brouci, dvoukřídlí, blanokřídlí a rostlinná složka, hlavně semena. Páry jsou monogamní, setrvávají spolu po několik let a často využívají i stejná teritoria. Hnízdo je v dutinách, nejčastěji ve stromech nebo budkách, řidčeji také v zemních dutinách, ve zdech, skalách nebo metrech dřeva.



Sýkora parukářka

Lophophanes cristatus




Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: sýkorovití

Je o něco menší než vrabec domácí, dorůstá 12–13 cm, v rozpětí křídel měří 17–20 cm a váží 10–13 g. Mezi evropskými sýkorami je zcela nezměnitelná, a to zejména díky výrazné chocholce na hlavě. Svrchní strana těla je hnědá, od černobílé hlavy jasně oddělená tmavým pruhem, který pokračuje až pod zobák, kde přechází do velké podélné skvrny. Sýkora parukářka se vyskytuje na rozsáhlém území Evropy a západní Asie. V létě se v její potravě objevují převážně malí bezobratlí, včetně členovců, hmyzu, jeho larev a pavouků, zatímco v zimě se živí semeny.





Lejsek šedý
Muscicapa striata



Konipas bílý
Motacilla alba



Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: lejskovití

Malý druh pěvce z čeledi lejskovitých o něco menší než vrabec, dorůstá délky 13,5-14,5 cm, v rozpětí křídel měří 23–25 cm a váží asi 16 g. Má štíhlé tělo, relativně velkou hlavu, dlouhá křídla a ocas. Svrchu je jednotvárně šedohnědý, spodinu těla má světlou, hruď nevýrazně hnědě pruhovanou. Končetiny, zobák i oči jsou tmavé. Obě pohlaví se zbarvením nijak neliší, mladí ptáci mají na svrchní straně těla světle hnědé skvrnění. Živí se zejména létajícím hmyzem, na který číhá z vyvýšené pozorovatelný a kterého se zmocňuje v letu.



Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: konipasovití

Velikosti štíhlého vrabce, s dlouhým úzkým ocasem, kterým neustále pohupuje nahoru a dolů. Samec ve svatebním šatě má černé temeno a šiji, ostře oddělenou od popelavě šedého pláštíku, bílé čelo a velkou černou náprsenku na hrudi. V Česku hnízdí na celém území, hlavně v nižších polohách, ale i vysoko v horách. V posledních desetiletích u nás dochází k poklesu stavů. Hnízdí jednotlivě, monogamně, hnízdo je v přírodních i umělých výklencích. Živí se hlavně drobným hmyzem, nejčastěji dvoukřídlými, síťokřídlými, chrostíky, vážkami a rovnokřídlými, příležitostně i dalšími bezobratlými, jako měkkýši, pavouky, chvostoskoky, blešivci aj. V zimě občas požívá také semena a bobule. Potravu sbírá při chůzi i v letu nejčastěji u vody.

